

Checkliste Studienpatienten Knie-TP

Subsartorial Saphenous Nerve Block (SSNB) vs Femoral Nerve Block (FNB) in primary Total Knee Arthroplasty

-> **intraoperativ erhalten die Patienten einen Nervenblock des N. saphenus oder des N. femoralis („etwas tiefer oder höher zwischen Leiste und Kniegelenk“) durch die Anästhesie.**

Wichtig: die Patienten und Operateure wissen nicht, welcher Nervenblock durchgeführt wird/wurde!

Wir verwenden zur Vereinfachung die männliche Form in allen Formularen, sprechen aber bewusst alle Geschlechter gleich an.

Vorbereitung

- Narkoseneinleitung wie gewohnt, immer Vollnarkose und ultraschall-kontrollierter Nervenblockade single shot (kein Katheter).
 - Es soll kein Pflaster auf die Punktionsstelle geklebt werden, damit die Verblindung erhalten bleibt.
 - Sollte trotzdem ein Patient mit einem Pflaster am Oberschenkel in den Operationssaal kommen, bitte möglichst bald entfernen, um die Verblindung des Operateurs zu gewährleisten, danke.
- Lagerung gemäss üblichem Schema.

Operationssaal

- Operationsschritte unverändert.
- Intraoperativ erfolgt ein IPACK durch Operateur (Infiltration Gelenkscapsel) bitte hierfür bei Studienpatienten immer 15ml Bupivacain® 0.5% am Tisch haben.
- Wundverband unverändert mit Kompressen und elastischem Einbinden.
- Anbringen eines Kniebrace in F/E 0-0-0° bei **ALLEN** Studienpatienten.

Bei Rückfragen:

Dr. Laura Buchmann (Tel. intern 7855) oder

Dr. Judith Bering (Tel. intern 1891, Do. extern Anliker 041-203 30 30)